

7 1798177 130653

Composição: Cada dose de vacina (antes da inativação de cada agente) contém: vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, IBR ($\geq 10^{7,50}$ DICT_{50%} /dose), Diarréia Viral Bovina, DVB ($\geq 10^{6,50}$ DICT_{50%} /dose), Parainfluenza Bovina tipo 3, PI-3 (≥ 40 UHA / dose), Bactéria de *Pasteurella haemolytica* (≥ 500 milhões UFC / dose), *Pasteurella multocida* (≥ 500 milhões UFC / dose), *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*) (≥ 100 milhões UFC / dose) com Adjuvante Platius 6HA500® (Hidróxido de Alumínio de Alta Adsorção Proteica), Solução Fisiológica Tampoadada qsp 5 mL. **Indicações:** é indicada na prevenção dos problemas respiratórios entéricos, reprodutivos e nervosos dos bovinos, causada pela ação individual ou combinada do vírus da IBR, DVB, PI-3, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*). **Dosagem:** Aplicar 5 mL por via subcutânea.

Cronograma vacinal para orientação: Bovinos pré cobertura (vacas, novilhas e touros): primeira dose 60 dias antes da cobertura. Segunda dose: 30 dias antes da cobertura. Vacas em Pré-Parto: Primeira Dose: aproximadamente ao sexto mês de prenhez. Segunda Dose: aproximadamente ao sétimo mês de prenhez. Bezerros ao pé: primeira dose ao terceiro mês de idade. Segunda dose ao quarto mês de idade. Bezerros em desmame precoce: primeira dose aos 30 dias. Segunda dose 15 dias antes do desmame. Ingresso ao estabelecimento ou confinamento de animais sem antecedentes de vacinação, primeira dose no ingresso e segunda dose 15 dias depois. Revacinar anualmente os animais. O esquema sugerido deve adaptar-se à recomendação do médico veterinário, segundo as necessidades de cada região ou estabelecimento. **Precauções e Advertências:** Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. EVITAR A AUTO-INOCULAÇÃO. A auto-inoculação poderá provocar reação inflamatória local, sem perigo à saúde. No caso de contato acidental com o produto, entre em contato imediatamente com um médico. Não vacinar animais enfermos, subnutridos, parasitados ou sob condições de estresse. Agitar bem o frasco antes de usar. Desinfetar o local da aplicação e usar seringas e agulhas estéreis. A vacina pode gerar uma reação no local da aplicação que desaparece progressivamente. Em caso de reação anafilática, administrar epinefrina 1% ou equivalente. Verificar o prazo de validade do produto. Uso concomitante com substâncias antibióticas e/ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. **Conservação:** Conservar entre 2°C a 8°C, devendo ser protegido da luz solar, calor e congelamento. Uma vez aberta, a vacina deverá ser utilizada dentro de 24 horas.

Proprietário e fabricante: Tecnovax S.A. - Luis Viale 2835 (C1416DNU) Cidade de Buenos Aires, Argentina. **#SENASA:** Cert. N° 05-092. Estab. Hab. N° 6520.

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: Tecnovax do Brasil Importação e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. Rua Edgar Marchiori, 255 Distrito Industrial, Vinhedo-SP CEP:13280-008. Responsável Técnico: Dra Bibiana Carneiro CRMV-SP: 9782. Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 9371 em 30/01/08. Vencimento: 24 meses após a data de fabricação.

PACON0333-2

PART:

FA.B.:

VEN.C.:

Providean®
RESPIRATORIA

Vacina inativada contra a Síndrome Respiratória

IBR • DVB • PI-3 • *Pasteurella multocida* • *Mannheimia haemolytica* (*Pasteurella haemolytica*)
• *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*)

250mL • 50 DOSES

Providean RESPIRATORIA

PRODUTO IMPORTADO 

USO VETERINÁRIO